

Terfin[®]

Terfin

Terbinafina HCl

Spray 1%

Fórmula: Cada 100 ml de Terfin Solución Spray contiene: Clorhidrato de terbinafina 1 g.
Excipientes: eter polioxi-etileno cetilsteárico, propilenglicol, alcohol etílico, agua purificada c.s

Acción Terapéutica: Antimicótico.

Indicado para hongos en:

- PIES
- INGLES
- MANOS
- TÓRAX
- AXILAS

Uso del medicamento:

lea detenidamente esta información: **Terfin Solución Spray**, está indicada para el tratamiento del pie de atleta (tinea pedis) y para las infecciones de la piel causadas por hongos ubicados en ingles (tiña crural), manos, tórax y axilas. Estas afecciones, generalmente se manifiestan a través de síntomas tales como picazón, ardor, sudoración, mal olor, sequedad, despegamiento, sarpullido y ulceración.

Cómo usar este medicamento: Adultos y niños mayores de 12 años:

antes de aplicar **Terfin Solución Spray**, deberá lavar el área afectada con agua y jabón. Luego seque cuidadosamente. Aplicar una o dos veces por día en la zona circundante. Para el pie de atleta (micosis de los pies), aplique con especial atención en los espacios entre los dedos, dos veces por día. Se recomienda cambiar las medias diariamente y antes de colocarse el calzado asegurarse que el interior esté seco. Lave las manos después de cada uso. La duración del tratamiento, siempre y cuando su uso sea regular e ininterrumpido, es de una semana.

Si los síntomas persisten o empeoran luego de la semana de tratamiento, consulte a su médico.

Advertencias y precauciones:

Sólo para uso externo. No utilizar este medicamento en: Hipersensibilidad a alguno de los componentes. Si existe irritación cutánea o alergia, suspenda el tratamiento y consulte a su médico. No aplicar en cuero cabelludo, boca, ojos, ni infecciones vaginales. No aplicar sobre lesiones en donde el alcohol podría ser irritante. Embarazo y lactancia, salvo bajo expresa prescripción médica.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad conocida a la Terbinafina o a cualquiera de los componentes de la fórmula. Lactancia.

Presentación: Envases conteniendo 15 g.

Conservar a temperatura ambiente (8 y 30) °C. (No refrigerar)

En caso de intoxicación comunicarse con el CIAT. Tel.: (02)1722.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta libre en condiciones reglamentarias.

Siga correctamente el modo de usar y no desapareciendo los síntomas consulte a su médico.

Representante del Laboratorio Elea S.A.C.I.F y A.



Urufarma



URUFARMA S.A.

Monte Caseros 3260 - Montevideo - Uruguay - Teléfono 2487 2424

E-mail: depto_medico@urufarma.com.uy

Pág. Web: www.urufarma.com.uy