

# Acnoxin®

## Ácido Salicílico - Resorcinol Monoacetato - Cloranfenicol

### Andrómaco

Venta bajo receta  
Industria Argentina

## loción - loción en spray

#### USO EXTERNO

#### Fórmula:

Cada 100 ml contiene:  
Cloranfenicol 0,5000 g; Resorcinol Monoacetato 2,0000 g; Ácido Salicílico 1,0000 g; Excipientes (Docusato de Sodio 0,5000 g; Colorante Azul Patente V 0,0005 g; Hidróxido de Sodio 0,3000 g; Alcohol Etilico 58,0124 g; Agua Purificada c.s.p. 100,0000 ml).

#### Acción terapéutica:

Antiacneico. Antibacteriano. Antiseborreico. Queratolítico.

#### Indicaciones:

Acné vulgaris en su forma inflamatoria papulo-pustulosa, foliculitis de la barba y foliculitis posterior a la depilación.

#### Características farmacológicas / Propiedades:

**Acción farmacológica:** El Ácido Salicílico facilita la descamación al solubilizar el cemento intercelular que mantiene unidas las escamas del estrato córneo, aflojando así la queratina. Este efecto queratolítico puede proveer una acción antifúngica porque la remoción del estrato córneo suprime el crecimiento micótico.

El Ácido Salicílico posee también una leve acción antiséptica.

La eficacia del Resorcinol y sus derivados en el tratamiento de diversas condiciones dermatológicas se relaciona con sus acciones antibacterianas, antifúngicas y queratolíticas. Las dos primeras estarían relacionadas con la precipitación de proteínas. Sin embargo, su acción queratolítica puede contribuir al efecto antifúngico por un mecanismo similar al descrito para el Ácido Salicílico.

El Cloranfenicol desarrolla su efecto bacteriostático, a favor de su liposolubilidad, por difusión a través de la membrana celular bacteriana,

siéndole en forma reversible con los ribosomas bacterianos. Previene la transferencia de aminoácidos a las cadenas peptídicas en crecimiento, inhibiendo la formación de uniones peptídicas y la subsecuente síntesis de proteínas.

#### Posología/Dosificación - Modo de administración:

**Posología habitual:** 1 a 3 aplicaciones diarias.

**Duración del tratamiento:** según criterio médico.

**Vía de administración:** Tópica.

**Dosis máximas y mínimas:**

**Máxima:** 3 aplicaciones diarias.

**Mínima:** 1 aplicación diaria.

#### Instrucciones de empleo:

**Loción:** Lavar previamente la zona afectada y aplicar la loción con un algodón friccionando suavemente.

**Loción en Spray:** Lavar previamente la zona afectada y rociar el producto sobre la misma.

#### Contraindicaciones:

No emplear esta medicación cuando existan antecedentes de alergia o reacción tóxica al Cloranfenicol.

Deberá considerarse la relación riesgo/beneficio en caso de sensibilidad al Ácido Salicílico o al Resorcinol.

#### Advertencias:

La administración tópica prolongada de Cloranfenicol puede provocar sensibilización de contacto y sobrecrecimiento de gérmenes resistentes. Se ha informado hipoplasia medular después de la aplicación tópica de Cloranfenicol.

El uso prolongado, especialmente sobre superficies ulceradas, puede producir mixedema debido a la acción antitiroidea del Resorcinol.

#### Precauciones:

Para uso externo exclusivamente.

Evitar el contacto con ojos y mucosas. Si esto ocurriera enjuagar con abundante agua y si persistiera alguna molestia concurrir a un centro asistencial.

Se aconseja no aplicar sobre la piel irritada o inflamada, lunares o verrugas faciales.

**Interacciones:** Aquellas preparaciones que contengan alguna de las siguientes sustancias, dependiendo de la cantidad presente, pueden interactuar con esta medicación.

- Jabones o productos para la limpieza del cutis, abrasivos o medicados.
  - Preparados para el acné que contengan algunos de los siguientes agentes de descamación o "peeling": Peróxido de Benzoilo, Azufre, Tretinoína.
  - Preparados de uso tópico que contengan Alcohol, tales como lociones o cremas de afeitar.
  - Cosméticos medicados o máscaras con un potente efecto secante.
- Su uso concurrente puede causar un efecto irritante o deshidratante acumulativo.

#### Reacciones adversas:

**De incidencia frecuente:** Hipersensibilidad al cloranfenicol (ardor, prurito, enrojecimiento, erupción, hinchazón u otros signos de irritación no presentes antes de la terapia), irritación cutánea leve, picazón, sensación de calor o ardor, enrojecimiento o descamación de la piel.

**De incidencia ocasional o rara:** Irritación moderada, no presente antes de la terapia.

**De incidencia rara:** Palidez cutánea, dolor de garganta, fiebre, hemorragias, hematomas, cansancio o debilidad inusuales (discrasias sanguíneas por Cloranfenicol).

#### Sobredosificación:

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con el centro toxicológico del Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez, Tel. (011) 4962 6666 / 2247; Hospital A. Posadas, Tel. (011) 4654 6648 ó 4658 7777.

#### Presentación:

Loción: Frascos con 140 ml.

Loción en Spray: Frascos con 140 ml.

#### Condiciones de conservación y almacenamiento:

Mantener el envase bien cerrado y protegido de la luz.  
Conservar a temperatura ambiente menor de 25°C.

"Mantener este y cualquier otro medicamento fuera del alcance de los niños".

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 31.383.

Director Técnico: Eduardo R. Nasuti, Farmacéutico.

Elaborado en Ruta Nacional N° 7, Km 779, Juana Koslay - 5701 - San Luis.

**Fecha de última actualización del prospecto: 2012.**

**En Uruguay:** Imp. y Distr. por URUFARMA S.A. Monte Caseros 3260, Montevideo. Representante N° 312. N° de Reg. 39103. D.T. Q.F. María del Carmen Cajaville. Solución y solución en spray. Tópico dérmico. Venta bajo receta profesional. Teléfono 0800-PIEL (7435).

**En Paraguay:** Imp. por IADELPA S.A.I.C.E.C.A. Tte. Rojas Silva N° 1043 esq. Manuel Ortiz Guerrero, 1er. Piso, Asunción. Aut. por D.N.V.S. del M.S.P. y B.S. Cert. N° 09873-02-EF. Q.F. Marta Chagra de Boesmi, Reg. Prof. N° 2428. Tel. (595 21) 233 600/1 Fax (595 21) 233 850. E-mail: piel@andromaco.com.py  
Ante alguna eventualidad concurrir al Centro Nacional de Toxicología: Teodoro S. Mongelós y Gral. Santos, Asunción. Tel. 204 800, 204 908, 203 113.



Andrómaco

Laboratorios Andrómaco S.A.I.C.I.  
Av. Ing. Huergo 1145 - C1107AOL - Bs. As.

**Acnoxin®**

Contactenos: **0810-666-PIEL** (7435)

E-mail: piel@andromaco.com.ar  
www.andromaco.com