

Secufem

Levonorgestrel 0,75 mg



Urufarma

LI-3747-04

Fórmula:

Cada comprimido contiene: Levonorgestrel 0,75 mg y excipientes c.s.

Acción terapéutica:

Anticonceptivo oral de emergencia.

Indicaciones:

Prevención del embarazo luego de una relación sexual sin protección.

Acción farmacológica:

Ovulostático. Modifica las condiciones del endometrio.

Posología y modo de administración:

Para asegurar la eficacia del tratamiento se deberá seguir las siguientes indicaciones: El primer comprimido se deberá ingerir con un vaso de agua lo antes posible, dentro de las 72 horas, luego de la relación sexual sin protección. El segundo comprimido se tomará 12 horas después del primer comprimido.

Otra eficaz manera de administrarlo, es la toma conjunta de ambos comprimidos, dentro de las 72 horas luego de la relación sexual sin protección.

Este medicamento puede administrarse en cualquier momento del ciclo sexual.

Luego de la utilización de este método de emergencia, se recomienda usar un método anticonceptivo de barrera (preservativo) hasta la aparición de la próxima menstruación.

Si utilizó **Secufem** durante un tratamiento con anticonceptivos orales, debe continuar este último de la manera habitual hasta finalizarlos.

Contraindicaciones:

Embarazo conocido o sospechado.

Antecedentes tromboembólicos y tromboflebitis.

Enfermedad cardiovascular y vascular encefálica.

Dislipidemias.

Cáncer genital o mamario confirmado o sospechado y otros tumores hormonodependientes.

Sangrado vaginal de etiología no determinada.

Ictericia.

Prurito generalizado.

Herpes u otosclerosis de presentación o agravados por el embarazo.

Síndrome de Dubin-Johnson o Rotor.

Enfermedad hepática severa y antecedentes de la misma.

Porfiria.

Precauciones y advertencias:

La anticoncepción de emergencia debe ser utilizada cuando el médico lo considere necesario. Deben considerarse las siguientes situaciones:

- La sobredosis que se administra no es deseable como tratamiento habitual.

- Este método no reemplaza a la anticoncepción oral tradicional.

El sangrado menstrual siguiente a la toma de **Secufem** aparecerá en la fecha prevista. Sin embargo, es posible que pueda suceder un adelanto o un retraso de algunos días. En aquellos casos en los que luego de la administración de **Secufem** se presente un sangrado anormal previo a la fecha esperada de la menstruación, o si la misma se atrasara más de cinco días, deberá efectuarse un test de embarazo para descartar su presencia.

La utilización de **Secufem** no protege de la posibilidad de contraer SIDA o cualquier otra enfermedad de transmisión sexual para lo cual la utilización del preservativo sigue siendo insustituible.

Secufem no debe administrarse en presencia de un embarazo extrauterino o salpingitis. Si vomitara dentro de las dos horas siguientes a la toma del comprimido, se recomienda tomar otro inmediatamente.

La administración reiterada dentro de un ciclo menstrual está desaconsejada debido a la posibilidad de alteraciones en el ciclo.

Lactancia

En mujeres que reciben por tiempo prolongado anticonceptivos orales conteniendo sólo progestágenos, se encuentran pequeñas cantidades de estos en la leche materna. No obstante, no se han observado efectos adversos relacionados con la medicación sobre la lactancia en lo que respecta a calidad y cantidad de la leche materna, por lo cual no se ve afectado el desarrollo y el crecimiento del lactante.

Consulte a su médico previo a la utilización del producto.

Conducción de vehículos o la utilización de máquinas:

Este medicamento no afecta capacidades individual para conducir un vehículo o para utilizar máquinas. De todas maneras debe evitarse si se presentaran algunas de las manifestaciones señaladas en reacciones adversas.

Omisión de la toma:

La eficacia de **Secufem** se verá comprometida si se omite tomar uno de los comprimidos.

Interacciones:

Está contraindicado su uso conjunto con retinoides pues provoca una disminución de la eficacia anticonceptiva.

Las asociaciones desaconsejadas son con inductores enzimáticos como anticonvulsivantes (Carbamazepina, Fenobarbital, Fenitoína, Primidona), Griseofulvina, Rifabutina, Rifampicina.

¿Qué es la anticoncepción de emergencia?

Es un método utilizado inmediatamente después de una relación sexual no protegida para prevenir un embarazo.

¿Cuándo usar un anticonceptivo de emergencia?

Debe ser utilizado lo antes posible, dentro de las siguientes 72 horas (3 días) luego de la relación sexual sin protección, especialmente si:

- Tuvo una relación sexual mientras usted o la pareja no utilizaban un método anticonceptivo.
- Si olvidó tomar una píldora anticonceptiva más allá del tiempo máximo permitido: en este caso vuelva a leer el prospecto de su anticonceptivo oral.
- Si el preservativo de su pareja se rompió o si olvidó utilizarlo.
- Si tiene la impresión de que su dispositivo intrauterino (DIU) fue expulsado.
- Si su diafragma se movió o lo retiró demasiado pronto.
- Si se tiene un fracaso del método de coito interrumpido o de otros métodos anticonceptivos naturales.
- En caso de violación.

En todos los casos debe consultar con su médico.

Reacciones adversas:

Los efectos no deseados que se han observado son:

- Náuseas, vómitos, vértigo, fatiga, cefalea, dolores abdominales, tensión mamaria, sangrado genital luego de la toma de los comprimidos.
- En cualquier caso, con estos u otros síntomas, es conveniente la consulta con el médico.

Sobredosisificación:

Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada. Ante la eventualidad de una sobredosisificación, concurrir al hospital más cercano.

Presentación:

Envase conteniendo 2 comprimidos.

Conservar a temperatura ambiente (15-30)°C

En caso de intoxicación comunicarse con el C.I.A.T. Tel. (02)1722.

Mantener fuera del alcance de los niños.

URUFARMA S.A.

Monte Caseros 3260 - Montevideo - Uruguay - Teléfono 2487 2424

E-mail: depto_medico@urufarma.com.uy

Pág. Web: www.urufarma.com.uy

