

TRIBUFF 100 mg



LI-5224-01

TRIBUFF 100 mg, está especialmente diseñado para la prevención de infarto de miocardio y como terapia antiplaquetaria en pacientes con desórdenes cardiovasculares, ya que los estudios realizados en los últimos años han demostrado que el Ácido Acetilsalicílico (A.A.S.) en bajas dosis (75 - 100 mg) administrado diariamente, presenta un efecto beneficioso en la prevención de enfermedades cardiovasculares.

El recubrimiento gastrorresistente que posee TRIBUFF 100 mg está diseñado para proteger el estómago de la irritación local y la forma de los comprimidos ayuda a pasar a través del estómago y disolverse en el intestino delgado.

FÓRMULA: Cada comprimido gastrorresistente contiene Ácido Acetilsalicílico 100 mg y excipientes c.s.

INDICACIONES Y USO: Debido al efecto potente y prolongado del ácido acetilsalicílico administrado en dosis bajas, sobre la función plaquetaria, es utilizado en el tratamiento o profilaxis de enfermedades asociadas con hiperagregación plaquetaria, tales como enfermedades en las arterias coronarias y otras arterias así como en las trombosis venosas profundas.

Se indica en tales casos, para reducir el riesgo de infarto de miocardio u otros accidentes vasculares.

POSOLOGÍA: Reducción de riesgo de infarto de miocardio: 1 comprimido por día bajo estricto control médico.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los salicilatos, úlcera péptica activa, último trimestre de embarazo.

ADVERTENCIAS: No administrar este medicamento a menores de 15 años, en caso de síntomas de GRIPE o VARICELA salvo indicación médica.

En caso de sobredosis, consultar inmediatamente al médico.

USO EN EMBARAZO Y LACTANCIA: Consultar al médico en caso de embarazo o lactancia.

PRESENTACIÓN: Envases conteniendo 30 y 60 comprimidos gastrorresistentes.

Venta libre en condiciones reglamentarias.

Conservar a temperatura ambiente (15 - 30) °C.

En caso de intoxicación comunicarse con el CIAT. Tel.: (02)1722 (Emergencias), 2487 40 00, 2481 21 11. Hospital de Clínicas p.7.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Siga correctamente el modo de usar y no desapareciendo los síntomas consulte a su médico.

PharmaNova.

Juan Ramón Gómez 3265 - Montevideo

Teléfono 2487 24 24.

E-mail: depto_medico@urufarma.com.uy

Pág. Web: www.urufarma.com.uy