

FLODIGRIP DESCONGESTIVO

ANTIGRIPAL



FÓRMULA

FLODIGRIP DESCONGESTIVO comprimidos recubiertos: Cada comprimido recubierto contiene Paracetamol 500 mg, Cafeína 30 mg, Fenilefrina Clorhidrato 8 mg, Loratadina 3 mg y excipientes c.s.

FLODIGRIP DESCONGESTIVO granulado para solución oral: Cada sobre de 3 g contiene Paracetamol 500 mg, Cafeína 30 mg, Fenilefrina Clorhidrato 8 mg, Loratadina 3 mg y excipientes c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

La acción analgésica y anti-pirética del Paracetamol alivia los dolores somáticos (cefalea, mialgias, etc.) y normaliza la temperatura corporal.

La acción levemente estimulante de la Cafeína recupera la sensación de bienestar y la capacidad de concentración, reduciendo la fatigabilidad propia de los estados gripales.

La acción vasoconstrictora de la Fenilefrina mejora la hiperemia molesta de las mucosas nasal y laríngea, descongestionando las vías aéreas superiores.

La potente y sostenida acción antialérgica de la Loratadina proporciona un rápido y mantenido alivio de la rinitis alérgica y de las manifestaciones alérgicas del estado gripal (rinitis, conjuntivitis) sin deprimir el sistema nervioso y sin mayores efectos secundarios anticolinérgicos: sequedad de boca, visión borrosa, etc.

INDICACIONES

Tratamiento sintomático de las afecciones gripales, fiebre, mialgia, decaimiento y resfrío.

REACCIONES ADVERSAS

Las reacciones adversas dependen de la sensibilidad individual. Las más frecuentes están relacionadas a la esfera gastrointestinal: náuseas, dispepsia. En mucho menor frecuencia: somnolencia y cefalea.

También se han reportado las siguientes reacciones adversas relacionadas con el Paracetamol: hepatotoxicidad, toxicidad renal, alteraciones en la fórmula sanguínea, hipoglucemia y dermatitis alérgica.

En lo que respecta a la Fenilefrina; en raras ocasiones se han reportado: Inquietud, ansiedad, nerviosismo, mareo, temblor, insomnio, irritabilidad, dolor de cabeza, disnea, vómitos, retención urinaria, sudoración incrementada, hiperglucemia, hipocaliemia, acidosis metabólica, hipertensión, hipotensión, bradicardia, palpitaciones.

Las reacciones adversas relacionadas con la Cafeína incluyen nerviosismo e irritación gastrointestinal.

Las reacciones adversas relacionadas a la Loratadina son: nerviosismo, cefalea, cansancio, somnolencia, aumento del apetito e insomnio.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. Insuficiencia hepática. Administrar con precaución en ancianos y pacientes cardíacos. No administrar en menores de 12 años.

No administrar en pacientes que han recibido tratamiento para la depresión con inhibidores de la monoaminoxidasa o con antidepresivos tricíclicos o para el Parkinson; pacientes con hipertiroidismo ni enfermedades cardiovasculares graves, ni feocromocitoma.

PRECAUCIONES

No se utilizará más allá del ataque agudo (6 a 10 días). Se utilizará con precaución en pacientes hipertensos, diabéticos, cardiopatas con afecciones tiroideas, glaucoma o retención urinaria. Si es diabético puede aumentar los niveles de azúcar en sangre. Si es alérgico a las xantinas, podría ser alérgico a la Cafeína.

Embarazo: El Paracetamol atraviesa la placenta por lo que no se recomienda administrar en el embarazo.

Lactancia: No se recomienda administrar este medicamento a madres en período de lactancia.

INTERACCIONES CON OTROS FÁRMACOS

Anticoagulantes orales y heparinas: Potenciación del efecto de éstos y aumento del riesgo de hemorragias.

Diuréticos: Disminución de la actividad de éstos.

Ciclosporina: Potenciación de la nefrotoxicidad.

Barbitúricos: Puede disminuir su acción terapéutica.

Antihipertensivos: Posible disminución del efecto antihipertensivo. La hepatotoxicidad potencial del Paracetamol puede verse incrementada por la administración de grandes dosis o dosis prolongadas de Barbitúricos, Carbamazepina, Hidantoínas, Isoniazida, Rifampicina y Sulfonpirazona, por inducción de las enzimas microsomales hepáticas. Estos fármacos también pueden provocar una disminución de los efectos terapéuticos del Paracetamol.

Domperidona y Metoclopramida: Aceleran la absorción de Paracetamol.

Lamotrigina/Zidovudina: Disminución del efecto terapéutico de estos fármacos.

Colestiramina: Disminuye la absorción del Paracetamol.

Anticolinérgicos: Disminuyen la absorción del Paracetamol, con posible disminución de su efecto.

Inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO): El uso simultáneo de Cafeína con IMAO's puede producir hipertensión, y taquicardia. Asimismo, la Fenilefrina puede potenciar los efectos vasopresores y cardíacos, y el riesgo de crisis hipertensivas.

β -Bloqueantes: La Fenilefrina puede inhibir su acción, pudiendo causar elevación de la presión arterial.

El Propanolol puede potenciar la acción del Paracetamol.

Bloqueantes α -adrenérgicos: Los bloqueantes α -adrenérgicos (tanto los usados como antihipertensivos como para hiperplasia benigna de próstata) utilizados junto con Fenilefrina pueden aumentar el riesgo de hipotensión y taquicardia. Asimismo no se recomienda el uso simultáneo de Fenilefrina con medicamentos de efecto similar (ej: ergotaminas, oxitocina) porque se puede producir un aumento de los efectos vaso constrictores.

Antidepresivos tricíclicos: Su uso simultáneo con Fenilefrina puede potenciar los efectos presores de la Fenilefrina.

POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

FLODIGRIP DESCONGESTIVO comprimidos recubiertos: 1 comprimido cada 8 horas. No superar los 4 comprimidos por día.

FLODIGRIP DESCONGESTIVO granulado para solución oral: 1 sobre cada 8 horas. No superar los 4 sobres por día. Verter el contenido del sobre en un vaso con 100 - 130 mL de agua y agitar hasta su disolución. Beber antes de los 30 minutos de preparado. Usar siempre la dosis menor que sea efectiva. Discontinuar el tratamiento una vez que hayan desaparecido los síntomas. Si transcurridos 5 - 7 días los síntomas no desaparecen, consulte a su médico.

PRESENTACIONES

FLODIGRIP DESCONGESTIVO comprimidos recubiertos: envase conteniendo 10 comprimidos recubiertos.

FLODIGRIP DESCONGESTIVO granulado para solución oral: envases conteniendo 5 y 30 sobres.

Mantener a temperatura ambiente (15 - 30)°C.

Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de intoxicación comunicarse con el CIAT. Tel (02) 1722

PharmaNova

Juan Ramón Gómez 3265 - Montevideo - Teléfono 2487 24 24

e-mail: depto_medico@urufarma.com.uy

Pág. Web: www.urufarma.com.uy