

# Ovumix®

Metronidazol  
Nitrato de Miconazol  
Sulfato de Neomicina  
Centella asiática  
Sulfato de Polimixina

## Óvulos vaginales

### Fórmula:

Cada óvulo contiene: Metronidazol 300 mg; Nitrato de Miconazol 100 mg; Sulfato de Neomicina 48,80 mg; Centella asiática 15 mg; Sulfato de Polimixina 4,40 mg y excipientes c.s.

### Acción terapéutica:

En Ovumix® se combinan la acción cicatrizante, regeneradora y protectora de tejido de la Centella asiática, con la eficacia antiinfecciosa de los restantes principios activos, a nivel de la mucosa vulvovaginal. La Centella asiática estimula el proceso de granulación y promueve una adecuada epitelización, la Neomicina y la Polimixina cubren un amplio espectro bacteriano, actuando sobre gérmenes gram positivos y gram negativos, el Miconazol aporta su acción antimicótica y el Metronidazol su acción tricomonida, giardicida y amebicida.

### Indicaciones:

Tratamiento local de las vulvovaginitis específicas e inespecíficas, particularmente cuando se asocian lesiones de la pared vaginal; vulvitis, vaginitis, cervicovaginitis irritativas o bacterianas, candidiasis, tricomoniasis y leucorreas de cualquier etiología.

### Posología y modo de administración:

El tratamiento debe iniciarse con 1 - 2 óvulos diarios. Mejorados los síntomas, continuar con 1 óvulo por día al acostarse, hasta que el proceso se complete.  
Introducir profundamente por vía vaginal.  
Aplicar durante un lapso de 5 a 10 días, como mínimo.

### Acciones colaterales y secundarias:

Raramente puede aparecer: ardor vulvovaginal, irritación y prurito.  
Teniendo en cuenta que se desconoce la proporción en que los diferentes principios activos se absorben a través de la mucosa vaginal, no puede excluirse la posibilidad de efectos sistémicos. El riesgo se eleva en pacientes con insuficiencia renal.

### Contraindicaciones:

- Hipersensibilidad a algunos de los componentes de la fórmula del producto o a derivados imidazólicos.
- Primer trimestre de embarazo.
- Lactancia.
- Pacientes con discrasias sanguíneas.
- Enfermedades activas del SNC.

### Precauciones y advertencias:

Administrar con precaución en pacientes con insuficiencia hepática severa.  
No usar el producto antes del coito, por dificultar la fecundación.  
El empleo de este producto, no previene el contagio de enfermedades de transmisión sexual.  
La base del óvulo vaginal puede alterar el látex de preservativos y diafragmas.



Urufarma

LI-5727-03

### Interacciones medicamentosas:

- Evitar lavados vaginales con sustancias alcalinas.
- Debido a que existe una baja absorción de las drogas por vía tópica, no pueden excluirse interacciones sistémicas, por lo que se desaconseja la asociación con: alcohol (efecto antabus), Warfarina, cumarina (potenciación del efecto anticoagulante) y Disulfiram.

### Sobredosificación:

Administrado el producto por la vía indicada, no existe riesgo de sobredosis.

### Presentación:

Envases con 6 óvulos.

Conservar a temperatura ambiente (15-30)°C

### Mantener fuera del alcance de los niños.

### URUFARMA S.A.

Monte Caseros 3260 - Montevideo - Uruguay - Teléfono 2487 2424  
E-mail: [depto\\_medico@urufarma.com.uy](mailto:depto_medico@urufarma.com.uy)  
Pág. Web: [www.urufarma.com.uy](http://www.urufarma.com.uy)  
Representante de Laboratorio Elea S.A.C.I.F. y A.

 **0800 8133**  
FonoMujer