

Ibupiretas



Urufarma

LI-5240-01

FÓRMULA:

Cada comprimido contiene 100 mg de Ibuprofeno y excipientes c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Antipirético-Analgésico-Antiinflamatorio no esteroideo.

Ibupiretas es un antitermoanalgésico de primera línea por sus beneficios en cuadros donde la fiebre se acompaña de dolor e inflamación; por la diferencia que tiene el Ibuprofeno frente a otros antifebriles (como por ejemplo: Dipirona, Paracetamol) que no resultan tan efectivos en el tratamiento del dolor.

INDICACIONES:

Tratamiento sintomático del dolor leve o moderado. Tratamiento sintomático de la fiebre. Tratamiento de la artritis reumatoide juvenil.

POSOLOGÍA:

La dosis se adaptará de acuerdo al criterio médico y al cuadro clínico del paciente. Para niños de 3 años hasta 12 años, la dosis recomendada de Ibuprofeno dependerá de la edad del niño. Como dosis media de orientación se sugiere:

| Edad | Dosis recomendada |
|----------------------|------------------------------|
| Niños de 3 a 7 años | 1 comprimido cada 6-8 horas |
| Niños de 8 a 12 años | 2 comprimidos cada 6-8 horas |

También puede establecerse un esquema de dosificación de 5 a 10 mg/Kg de peso y por toma, cada 6-8 horas: máximo 20 mg/Kg de peso y por día.

Jóvenes de 12 a 18 años se tomará una dosis de 200 mg cada 4-6 horas, si fuera necesario.

No administrar más de 12 comprimidos (1200 mg) al cabo de 24 horas.

Para el tratamiento de la artritis reumatoide juvenil podrían ser necesarias dosis superiores, aunque se recomienda no sobrepasar los 40 mg/Kg/día de Ibuprofeno.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Se debe evitar la administración concomitante de Ibuprofeno con otros AINES.

Se recomienda precaución en el caso de pacientes que estén recibiendo tratamientos concomitantes que puedan elevar el riesgo de úlcera o sangrado gastrointestinal como la administración concomitante de corticoides orales.

Si se produjera una hemorragia gastrointestinal o una úlcera en pacientes en tratamiento con Ibuprofeno, el tratamiento debe suspenderse inmediatamente.

REACCIONES ADVERSAS

Las mismas pueden minimizarse si se utiliza la menor dosis eficaz durante el menor tiempo posible para controlar los síntomas.

Trastornos gastrointestinales: Las reacciones adversas que se observan con mayor frecuencia son de naturaleza gastrointestinal. Puede producirse: Dispepsia, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal.

Cefalea, vértigo, mareo, fatiga o somnolencia, erupción cutánea, urticaria, prurito, púrpura (incluida la púrpura alérgica), angioedema.

Raramente, alteración de la función hepática, hepatitis, ictericia, lesión hepática; puede prolongarse el tiempo de sangrado.

CONTRAINDICACIONES

- Hipersensibilidad al Ibuprofeno o a cualquiera de los componentes de la fórmula.
- Hipersensibilidad a salicilatos o a otros AINE's. (Pacientes que hayan experimentado crisis de asma, rinitis aguda, urticaria, edema angioneurótico u otras reacciones de tipo alérgico tras haber utilizado sustancias de acción similar).
- Pacientes con antecedentes de hemorragia gastrointestinal o perforación relacionados con tratamientos anteriores con AINE's.
- Úlcera péptica/hemorragia gastrointestinal activa o recidivante (dos o más episodios diferentes de ulceración o hemorragia comprobados)
- Enfermedad inflamatoria intestinal.
- Insuficiencia cardíaca grave (clase IV de la NYHA) Insuficiencia renal grave.
- Insuficiencia hepática grave.
- Pacientes con diátesis hemorrágica u otros trastornos de la coagulación.

SOBREDOSIS

La mayoría de los casos de sobredosis han sido asintomáticos. Existe un riesgo de sintomatología con dosis mayores de 80 - 100 mg/Kg de Ibuprofeno.

La aparición de los síntomas por sobredosis se produce habitualmente en un plazo de 4 horas. Los síntomas leves son los más comunes, e incluyen dolor abdominal, náuseas, vómitos, letargia, somnolencia, cefalea, nistagmus, tinnitus y ataxia. Raramente han aparecido síntomas moderados o intensos, como hemorragia gastrointestinal, hipotensión, hipotermia, acidosis metabólica, convulsiones, alteración de la función renal, coma, distress respiratorio del adulto y episodios transitorios de apnea (en niños después de ingerir grandes cantidades).

El tratamiento es sintomático y no se dispone de antidoto específico.

PRESENTACIÓN:

Envase conteniendo 10 comprimidos masticables.

Conservar a temperatura ambiente (15 - 30)°C

En caso de intoxicación comunicarse con el C.I.A.T. Tel.: (02) 1722.

Mantener fuera del alcance de los niños

URUFARMA S.A.

Monte Caseros 3260 – Montevideo – Uruguay – Teléfono: 2487 2424

e-mail: depto_medico@urufarma.com.uy

Pág. Web: www.urufarma.com.uy