



Urufarma

Supositorio de Glicerina - Adultos

Glicerina



Fórmula: Cada supositorio de 2,92 g contiene: Glicerina 2,68 g y excipientes c.s.

Indicaciones y dosis: Constipación ocasional. Dosis según prescripción médica. Vía rectal.

Indicado en adultos y adolescentes a partir de 12 años. La dosis recomendada es de 1 supositorio al día.

Información sobre el producto: Para lograr la evacuación, aplicar un supositorio y dejar actuar 15-30 minutos, no es necesario que el supositorio se disuelva completamente para que produzca su efecto.

En caso de constipación severa, se puede repetir la aplicación 30 a 60 minutos después de la primera aplicación.

1



1- Cortar por la línea perforada ejerciendo una pequeña fuerza.

2



2- Separar los dientes superiores.

3



3- Tirar hacia abajo hasta que el supositorio quede libre.

4



MODO CORRECTO



MODO INCORRECTO

4- Introducir en el ano, primeramente el extremo trunco impulsando desde la base cónica.

Precauciones y Advertencias: Sólo para ser usado por vía rectal. No utilizar por más de una semana o en forma prolongada sin consultar al médico. No utilizar ante todo cuadro de constipación reciente no justificado, por un cambio en el modo de vida o acompañado de dolor, fiebre o distensión del vientre, náuseas o vómitos, consultar al médico. La aparición de sangre rectal o falla en obtener movimiento de intestino luego del tratamiento puede indicar una causa seria, por lo que debe interrumpir el tratamiento y consultar al médico. En pacientes con cuadros patológicos graves especialmente cardiovasculares deberá utilizarse únicamente bajo estricto control médico. Evitar habituarse a los laxantes, el uso indebido o el uso prolongado puede producir dependencia en la función intestinal.

Contraindicaciones: Evite su uso en presencia de hemorroides, fisura anal o rectocolitis hemorrágica.

Reacciones adversas: Puede causar ardor, irritación, escozor o picor en la zona rectal, dolor e irritación anal.

Conservar a temperatura ambiente (15-30)°C. Mantener fuera del alcance de los niños. Venta libre en condiciones reglamentarias. Siga correctamente el modo de usar y no desapareciendo los síntomas, consulte a su médico.



Supositorio de Glicerina - Infantiles VER



URUFARMA S.A.

Monte Caseros 3260 - Montevideo - Uruguay - Teléfono 2487 2424

E-mail: depto_medico@urufarma.com.uy

Pág. Web: www.urufarma.com.uy